

ورقة حقائق ما الفرق بين الإجهاض الجراحي والإجهاض الدوائي؟

| الإجهاض الدوائي | الإجهاض الجراحي | |
|---|---|-------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • اختبار الدم - قبله وبعده • تحديد عمر الحمل بالموجات فوق الصوتية | <ul style="list-style-type: none"> • اختبار الدم - قبل العملية • تحديد عمر الحمل بالموجات فوق الصوتية | الاختبارات المطلوبة |
| <ul style="list-style-type: none"> • يجب إجراؤه قبل مرور 9 أسابيع من الحمل • بعد 6 أسابيع من الحمل عادة | <ul style="list-style-type: none"> • يُجرى بعد الحمل بستة أسابيع غالبًا • تزداد تكلفته بعد مرور 12 أسبوعًا من الحمل | التوقيت |
| <ul style="list-style-type: none"> • تتناولين الأدوية في بيتك أو في مكان آمن آخر • تحدث انقباضات ونزيف شديد في أول بضع ساعات • نزيف خفيف يدوم عادة لما يقرب من 6 أسابيع • ولكن قد يستمر لما يصل إلى 6 أسابيع • يوصى بتناول أقراص لتخفيف الألم والغثيان • يُطلب موعد متابعة للتأكد من اكتمال الإجهاض | <ul style="list-style-type: none"> • يتطلب مخرّجًا خفيفًا • تُجرى العملية الجراحية في إحدى عيادات جراحة اليوم الواحد • تستغرق العملية نحو 10 دقائق • يتطلب التعافي ما يصل إلى 4 ساعات في عيادة جراحة اليوم الواحد • يحدث نزيف خفيف في بعض الأحيان لفترة قد تصل إلى أسبوعين، وقد لا يحدث نزيف مطلقًا • توصف معه مضادات حيوية • لا يُحدّد موعد للمتابعة إلا عند حدوث مضاعفات أو وجود مخاوف | الإجراءات |
| <ul style="list-style-type: none"> • تحتاجين إلى شخص بالغ أهل للمسؤولية لرعايتك في أول 24 ساعة بعد تناول الأدوية | <ul style="list-style-type: none"> • تحتاجين إلى شخص بالغ أهل للمسؤولية كي يرافقك إلى البيت من عيادة جراحة اليوم الواحد • لا يمكنك القيادة بعد العملية | الدعم والتعافي |
| <ul style="list-style-type: none"> • من المتوقع حدوث نزيف وانقباضات • قد تُصابين أيضًا بالحمى والرجفة والغثيان والتقيؤ | <ul style="list-style-type: none"> • قد تشعرين بالتعب بسبب تأثير المخرّج • قد يصيبك نزيف وانقباضات خفيفة - لا يدوم لأكثر من أسبوعين عادةً | الآثار الجانبية |
| <ul style="list-style-type: none"> • النزيف الشديد • العدوى • عدم اكتمال الإجهاض • استمرار الحمل | <ul style="list-style-type: none"> • إصابة بطانة الرحم أو عنق الرحم • العدوى • انثقاب الرحم (ثقب صغير) • رد فعل للمخرّج | المضاعفات / المخاطر |
| <ul style="list-style-type: none"> • مضاعفات كلٍّ من الإجهاض الجراحي والإجهاض الدوائي نادرة | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • متوفر حتى 9 أسابيع من الحمل في جميع عيادات FPNSW • يتطلب 3 مواعيد - للتقييم ووصف الأدوية والمتابعة | <ul style="list-style-type: none"> • متوفر حتى 12 أسبوعًا + 6 أيام من الحمل في تشاتسوود Chatswood • يتطلب مواعدين - واحد للتقييم والآخر للعملية | التوفر في عيادات FPNSW |

لمزيد من المعلومات

- Family Planning NSW Talkline

1300 658 886 أو: www.fpnsw.org.au/talkline

- خدمة ترحيل الكلام الوطنية (للصم) -

13 36 77

- TIS National خدمة الترجمة الفورية من

131 450

تفضلوا بزيارة أقرب عيادة من عيادات Family

Planning NSW لتنظيم الأسرة -

www.fpnsw.org.au/clinics

ورقة حقائق للعملاء من عيادات Family

Planning NSW - [https://www.fpnsw.org.au/](https://www.fpnsw.org.au/factsheets/individuals/cervical-screening/hpv-vaccination)

[factsheets/individuals/cervical-screening/hpv-](https://www.fpnsw.org.au/factsheets/individuals/cervical-screening/hpv-vaccination)

[vaccination](https://www.fpnsw.org.au/factsheets/individuals/cervical-screening/hpv-vaccination)

- Family Planning NSW مصادر لعملاء

<https://www.fpnsw.org.au/changes>

www.fpnsw.org.au | الخط الساخن: 1300658886 | المتجر

الخدمات والمعلومات السريرية | التعليم والتدريب | البحث | التنمية الدولية
منظمة Family Planning NSW هي منظمة غير ربحية تمولها وزارة الصحة في نيو ساوث ويلز

تم توفير المعلومات الواردة في صحيفة الحقائق هذه بغرض التوعية فقط. وقد اجتهدت منظمة FPNSW (Family Planning NSW) للتأكد من أن المعلومات دقيقة و محدثة وقت النشر. هذه الصحيفة لا يُقصد بها تقديم نصيحة طبية محددة أو أن تكون بديلاً للمشورة الفردية من أخصائي الرعاية الصحية. حقوق النشر: © FPNSW 2018
لا يُسمح بنسخ ورقة الحقائق هذه بدون تصريح. تمت المراجعة في: أكتوبر/تشرين الأول 2020