

手术流产或药物流产——有什么区别？

	手术流产	药物流产
所需测试	<ul style="list-style-type: none"> • 血检 — 流产前 • 测定怀孕日期的超声检查 	<ul style="list-style-type: none"> • 血检 — 流产前和流产后 • 测定怀孕日期的超声检查
时间	<ul style="list-style-type: none"> • 通常在怀孕6周之后进行 • 怀孕12周后费用更高 	<ul style="list-style-type: none"> • 必须在怀孕9周内进行 • 通常在怀孕6周之后进行
过程	<ul style="list-style-type: none"> • 需要轻度麻醉 • 在日间手术诊所进行手术 • 过程约10分钟 • 需要在日间手术诊所恢复四小时或以下 • 有时会出现至多2周的轻微出血或不出血 • 给予抗生素 • 仅在出现并发症或引发担忧的状况时才进行后续会诊 	<ul style="list-style-type: none"> • 在您的家中或其他安全的地方服用药物 • 前几个小时会出现痉挛和大量出血 • 轻微出血通常持续约2周，但也可能持续至多6周 • 建议服用止痛药和止吐药 • 需要随访会诊以确保流产成功
支持和康复	<ul style="list-style-type: none"> • 您需要一位负责任的成年人将您从日间手术诊所接回家 • 手术后您无法开车 	<ul style="list-style-type: none"> • 在服药后的24小时内，您需要有一位负责任的成年人陪伴您，为您提供支持
副作用	<ul style="list-style-type: none"> • 可能会因麻醉而感到疲倦 • 可能会出血和出现轻度痉挛——通常持续不到2周 	<ul style="list-style-type: none"> • 预计会出现出血和痉挛 • 也可能出现发烧、发冷、恶心和呕吐
并发症/风险	<ul style="list-style-type: none"> • 子宫内膜或子宫颈损伤 • 感染 • 子宫穿孔（一个小洞） • 对麻醉剂起反应 	<ul style="list-style-type: none"> • 大量出血 • 感染 • 流产不成功 • 继续妊娠
	<ul style="list-style-type: none"> • 手术和药物流产的并发症都很少见 	
能否在FPNSW进行	<ul style="list-style-type: none"> • 在最多12周 + 6天的孕期内可在Chatswood进行 • 需要两次预约——检查和手术 	<ul style="list-style-type: none"> • 孕期9周或以下可在所有新南威尔士州家庭生育计划（FPNSW）诊所进行 • 需要3次预约——检查、开处方和随访

如需了解更多信息

新南威尔士州家庭生育计划热线 –

www.fpnsw.org.au/talkline or 1300 658 886

全国转接服务（针对聋人）–

13 36 77

全国口笔译服务处（TIS National）的口译服务 –

131 450

访问离您最近的新南威尔士州家庭生育计划（Family Planning NSW）诊所 –

www.fpnsw.org.au/clinics

新南威尔士州家庭生育计划（Family Planning NSW）客户资料单 –

<https://www.fpnsw.org.au/factsheets/individuals/cervical-screening/hpv-vaccination>

新南威尔士州家庭生育计划（Family Planning NSW）客户资源 –

<https://www.fpnsw.org.au/changes>

www.fpnsw.org.au | 热线 1300 658 886 | 商店

临床服务和信息|教育和培训|研究|国际发展

新南威尔士州家庭生育计划（Family Planning NSW）是一个由新南威尔士州卫生部资助的非营利组织

本资料单中的信息仅用于教育目的。新南威尔士州家庭数计划（Family Planning NSW，简称FPNSW）已尽一切努力确保信息在发布时准确且最新。这些信息并非用来提供特定的医疗建议或取代医疗专业人士的个人建议。版权所有@ FPNSW 2018。未经授权不得复制本资料单。审核时间：2020年10月