

سقط با استفاده از دارو	سقط جنین با روش جراحی	آزمایشات مورد نیاز
<ul style="list-style-type: none"> <li>آزمایش خون - قبل و بعد</li> <li>سونوگرافی تعیین سن</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>آزمایش خون - قبل از انجام آن</li> <li>سونوگرافی تعیین سن</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>زمان بندی</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>باید قبل از هفته 9 بارداری انجام شود</li> <li>معمولاً بعد از هفته ششم بارداری انجام می شود</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>معمولاً بعد از هفته ششم بارداری انجام می شود</li> <li>بعد از هفته 12 بارداری هزینه بیشتری دارد</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>فرآیند</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>داروها در خانه یا مکان امن دیگری مصرف می شوند</li> <li>گرفتگی و خونریزی شدید در چند ساعت اول خونریزی خفیف معمولاً حدود 2 هفته طول می کشد اما می تواند تا 6 هفته ادامه یابد</li> <li>قرص های مسکن و ضد تهوع توصیه می شود</li> <li>یک نوبت ملاقات برای اطمینان از تکمیل سقط جنین لازم است</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>به یک بیهوشی سبک نیاز دارد</li> <li>روش جراحی در کلینیک جراحی سرپایی</li> <li>این جراحی حدود 10 دقیقه طول می کشد تا 4 ساعت زمان ناهت در کلینیک جراحی سرپایی</li> <li>گاهی اوقات خونریزی خفیف تا 2 هفته یا بدون خونریزی</li> <li>آنتی بیوتیک تجویز می شود</li> <li>فقط در صورت وجود هرگونه عارضه یا نگرانی، نوبت ملاقات بعدی تعیین می شود</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>پشتیبانی و بهبودی</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>در 24 ساعت اول پس از مصرف داروها باید یک بزرگسال مسئولیت پذیر برای کمک به شما حضور داشته باشد</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>شما به یک بزرگسال مسئولیت پذیر نیاز دارید تا شما را از کلینیک جراحی سرپایی به خانه ببرد</li> <li>بعد از عمل نمی توانید رانندگی کنید</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>عوارض جانبی</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>خونریزی و گرفتگی مورد انتظار است</li> <li>تب، لرز، حالت تهوع و استفراغ نیز ممکن است رخ دهد</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ممکن است به دلیل داروی بی حسی احساس خستگی کنید</li> <li>ممکن است خونریزی و گرفتگی خفیف داشته باشید</li> <li>- معمولاً کمتر از 2 هفته طول می کشد</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>عوارض / خطرات</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>خونریزی شدید</li> <li>عفونت</li> <li>سقط جنین ناقص</li> <li>ادامه بارداری</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>آسیب به پوشش داخلی رحم یا دهانه رحم</li> <li>عفونت</li> <li>سوراخ شدن رحم (یک سوراخ کوچک)</li> <li>واکنش به داروی بی حسی</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>عوارض سقط جنین با روش جراحی و یا استفاده از دارو، نادر است</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>تا هفته 9 بارداری در تمام کلینیک های FPNSW موجود است</li> <li>نیازمند 3 نوبت ملاقات می باشد - ارزیابی، تجویز و پیگیری</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>تا 12 هفته + 6 روز از بارداری در Chats- Wood موجود است</li> <li>نیازمند 2 نوبت ملاقات می باشد - ارزیابی و عمل</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>در دسترس بودن در FPNSW</li> </ul>

## برای کسب اطلاعات بیشتر

### خط تلفن تنظیم خانواده NSW

1300 658 886 یا [www.fpnsw.org.au/talkline](http://www.fpnsw.org.au/talkline)

خدمات ملی رله (برای افراد ناشنوا) -

13 36 77

### خدمات ترجمه شفاهی ملی TIS

131 450

از نزدیکترین کلینیک تنظیم خانواده NSW دیدن

کنید - [www.fpnsw.org.au/clinics](http://www.fpnsw.org.au/clinics)

### برگه اطلاعات مراجعه‌کنندگان تنظیم خانواده

NSW - <https://www.fpnsw.org.au/factsheets/individuals/cervical-screening/hpv-vaccination>

منابع مراجعه‌کنندگان تنظیم خانواده NSW -

<https://www.fpnsw.org.au/changes>

[www.fpnsw.org.au](http://www.fpnsw.org.au) | خط تلفنی راهنما 1300 658 886 | دریافت

اطلاعات و خدمات بالینی | آموزش و پرورش | پژوهش | توسعه بین‌المللی

تنظیم خانواده NSW (Family Planning NSW) یک سازمان غیرانتفاعی است که بودجه آن توسط وزارت بهداشت NSW تأمین می‌شود

اطلاعات موجود در این برگه اطلاعات فقط با هدف آموزش ارائه شده است. تنظیم خانواده NSW (FPNSW) تمام دقت خود را به کار گرفته است تا اطمینان حاصل کند اطلاعات در زمان انتشار صحیح و به روز هستند. این اطلاعات توصیه‌های پزشکی خاصی را ارائه نمی‌دهند یا جایگزین توصیه‌های فردی متخصص مراقبت‌های بهداشتی نمی‌شوند. حق چاپ © FPNSW 2018. تکثیر این برگه بدون مجوز مجاز نیست. تاریخ بازبینی: اکتبر 2020