

ការរំលូតកូនដោយការវះកាត់ ឬការរំលូតកូនដោយ ការប្រើថ្នាំ - តើខុសគ្នាត្រង់ចំណុចណា ?

	ការរំលូតកូនដោយការវះកាត់	ការរំលូតកូនដោយការប្រើថ្នាំ
ការធ្វើតេស្តដែលតម្រូវឱ្យមាន	<ul style="list-style-type: none"> ការធ្វើតេស្តឈាម - មុន ឆ្លុះអេកូត្រីមាសទីមួយ 	<ul style="list-style-type: none"> ការធ្វើតេស្តឈាម - មុន និងក្រោយ ឆ្លុះអេកូត្រីមាសទីមួយ
ពេលវេលា	<ul style="list-style-type: none"> ជាធម្មតាត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីគភ៌មានអាយុ 6 សប្តាហ៍ កាន់តែថ្លៃថ្នូរពោះគភ៌ដែលមានអាយុលើសពី 12 សប្តាហ៍ 	<ul style="list-style-type: none"> ត្រូវធ្វើឡើងមុនសប្តាហ៍ទី 9 នៃការមានផ្ទៃពោះ ជាធម្មតាត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីគភ៌មានអាយុ 6 សប្តាហ៍
ដំណើរការ	<ul style="list-style-type: none"> តម្រូវឱ្យមានការប្រើថ្នាំស្តីកកម្រិតស្រាល នីតិវិធីវះកាត់នៅគ្លីនិកវះកាត់ពេលថ្ងៃ នីតិវិធីត្រូវចំណាយពេលប្រហែល 10 នាទី រយៈពេលនៃការធូរស្បើយឡើងវិញគឺរហូតដល់ 4 ម៉ោង នៅគ្លីនិកវះកាត់ពេលថ្ងៃ ជូនកាលមានធ្លាក់ឈាមតិចៗរហូតដល់ 2 សប្តាហ៍ ឬមិនមានហូរឈាម មានផ្តល់ថ្នាំជូរ មានការណាត់ជួបតាមដានតែក្នុងករណីដែលមានផលវិបាក ឬមានកង្វល់ប៉ុណ្ណោះ 	<ul style="list-style-type: none"> លេបថ្នាំនៅផ្ទះរបស់អ្នកផ្ទាល់ ឬនៅកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពផ្សេងទៀត ការរមួលស្បូន និងធ្លាក់ឈាមច្រើនក្នុងរយៈពេលពីរបីម៉ោងដំបូង ការធ្លាក់ឈាមតិចៗ ជាធម្មតាមានរយៈពេលប្រហែល 2 សប្តាហ៍ ប៉ុន្តែអាចបន្តរហូតដល់ 6 សប្តាហ៍ ណែនាំឱ្យប្រើគ្រាប់ថ្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់ និងថ្នាំមិនឱ្យក្អួត តម្រូវឱ្យមានការណាត់ជួបតាមដាន ដើម្បីប្រាកដថាការរំលូតកូនបានបញ្ចប់
ការគាំទ្រ និងការធូរស្បើយឡើងវិញ	<ul style="list-style-type: none"> អ្នកនឹងត្រូវការមនុស្សពេញវ័យដែលមានទិសដៅខុសត្រូវ ដើម្បីនាំអ្នកពីគ្លីនិកវះកាត់ពេលថ្ងៃទៅផ្ទះ អ្នកមិនអាចបើកបររបន្ទាប់ពីការអនុវត្តនីតិវិធីបានទេ 	<ul style="list-style-type: none"> អ្នកនឹងត្រូវមានមនុស្សពេញវ័យដែលមានទិសដៅខុសត្រូវមកជាមួយអ្នកដើម្បីជួយក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោងដំបូងបន្ទាប់ពីការប្រើថ្នាំ
ផលវិបាក	<ul style="list-style-type: none"> អាចមានអារម្មណ៍អស់កម្លាំងដោយសារថ្នាំស្តីក អាចមានធ្លាក់ឈាម និងរមួលស្បូនតិចតួច - ជាធម្មតាតិចជាង 2 សប្តាហ៍ 	<ul style="list-style-type: none"> គេរំពឹងថានឹងមានការរមួលស្បូន និងធ្លាក់ឈាម អាចនឹងមានអាការៈក្តៅខ្លួន ញាក់ ក្អួត ចង្កោរផងដែរ
ផលវិបាក / ហានិភ័យ	<ul style="list-style-type: none"> រហូសភ្នាសក្នុងស្បូន ឬមាត់ស្បូន ការឆ្លងមេរោគ ការធ្លុះស្បូន (រន្ធតូច) ប្រតិកម្មនឹងថ្នាំស្តីក 	<ul style="list-style-type: none"> ការធ្លាក់ឈាមច្រើន ការឆ្លងមេរោគ ការរំលូតកូនមិនពេញលេញ ការបន្តមានផ្ទៃពោះ
	<ul style="list-style-type: none"> ផលវិបាកសម្រាប់ការរំលូតកូនដោយការវះកាត់ និងដោយការប្រើថ្នាំគឺកម្រមានណាស់ 	
អាចរកបាននៅ FPNSW	<ul style="list-style-type: none"> អាចធ្វើបានសម្រាប់គភ៌ដែលមានអាយុរហូតដល់ 12 សប្តាហ៍ + 6 ថ្ងៃនៅ Chatswood តម្រូវឱ្យមានការណាត់ជួប 2 ដង - ការវាយតម្លៃ និងនីតិវិធី 	<ul style="list-style-type: none"> អាចធ្វើបានសម្រាប់គភ៌ដែលមានអាយុរហូតដល់ 9 សប្តាហ៍នៅគ្រប់គ្លីនិក FPNSW ទាំងអស់ តម្រូវឱ្យមានការណាត់ជួប 3 ដង - ការវាយតម្លៃ ការចេញវេជ្ជបញ្ជា និងការតាមដាន

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម

បណ្តាញ Family Planning NSW Talkline –
www.fpnsw.org.au/talkline ឬ 1300 658 886

សេវាកម្មបញ្ជូនបន្តថ្នាក់ជាតិ (សម្រាប់មនុស្សថ្លង់) –
13 36 77

សេវាកម្មបកប្រែ TIS National's interpreting service –
131 450

ទៅកាន់គ្លីនិក Family Planning NSW ដែលនៅជិតអ្នក
បំផុត – www.fpnsw.org.au/clinics

ឯកសារព័ត៌មានអតិថិជនរបស់ Family Planning NSW –
[https://www.fpnsw.org.au/factsheets/individuals/
cervical-screening/hpv-vaccination](https://www.fpnsw.org.au/factsheets/individuals/cervical-screening/hpv-vaccination)

ធនធានអតិថិជនរបស់ Family Planning NSW –
<https://www.fpnsw.org.au/changes>